

# Hartmann-műtét

Beteg adatai

---

---

---

Feljegyzések

---

---

---

---

---

## Az emésztőrendszer

Nyelőcső


Gyomor

Vékonybél (ileum)

Vastagbél (colon)


Végbél

Végbélnyílás




# Hartmann-műtét

## 1. Rákos daganat




A Hartmann-műtétet a vastagbél számos különböző betegségében, többek között rákos daganat vagy divertikulózis/divertikulitisz esetén végzik (divertikulumok: bogyó alakú, a vastagbél falában nagy számban keletkező vak tasakok; ezek az ún. „gurdélyok” gyulladásba jöhetnek és át is fúródhatnak).

## 2. A vastagbél vagy a végbél eltávolítása



A műtét során eltávolítják a vastagbél beteg szakaszát, majd elterelik a széklet (salakanyagok) útját. A végső szakaszt „vakon” zárják.

## 3. Vastagbél-vendégnyílás és a vastagbél vakon végződő, végső szakasza



A beteg bélszakasz eltávolítása után az ép vastagbelet a hasfalra kivezelve vendégnyílást (sztómát) készítenek, ez az ún. „kolosztóma” (kolon: görögül vastagbél). A vastagbél kirekesztett, végső szakaszát általában sebészeti varrógéppel lezárják és a hasüregben hagyják. Később (kb. 3 hónap múlva), egy újabb műtét alkalmával a sztóma megszüntethető és a bélrendszer folytonossága helyreállítható.